

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

LISOMUCIL TOSSE MUCOLITICO 750 mg/15 ml sciroppo con zucchero LISOMUCIL TOSSE MUCOLITICO 750 mg/15 ml sciroppo senza zucchero

Carbocisteina

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

Prenda questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.
- Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo 5 giorni.

Contenuto di questo foglio:

1. Che cos'è LISOMUCIL TOSSE MUCOLITICO e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere LISOMUCIL TOSSE MUCOLITICO
3. Come prendere LISOMUCIL TOSSE MUCOLITICO
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare LISOMUCIL TOSSE MUCOLITICO
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. Che cos'è LISOMUCIL TOSSE MUCOLITICO e a cosa serve

Questo medicinale contiene il principio attivo carbocisteina, che appartiene ad un gruppo di medicinali chiamati mucolitici, usati per facilitare l'eliminazione del muco dalle vie respiratorie.

LISOMUCIL TOSSE MUCOLITICO è indicato per il trattamento delle malattie dell'apparato respiratorio, caratterizzate da tosse e catarro dell'adulto.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o si sente peggio dopo 5 giorni.

2. Cosa deve sapere prima di prendere LISOMUCIL TOSSE MUCOLITICO

Non prenda LISOMUCIL TOSSE MUCOLITICO

- se è allergico a carbocisteina o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6);
- se soffre di un problema allo stomaco o all'intestino chiamato ulcera attiva gastroduodenale;
- se è in stato di gravidanza o se sta allattando al seno (vedere il paragrafo "Gravidanza e allattamento").

LISOMUCIL TOSSE MUCOLITICO è controindicato nei bambini e adolescenti.

Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico o al farmacista prima di prendere LISOMUCIL TOSSE MUCOLITICO.

Se oltre alla tosse, manifesta febbre e/o difficoltà a respirare, si rivolga al medico il quale stabilirà la terapia adatta.

Si raccomanda cautela nei pazienti anziani, pazienti asmatici con una storia di problematiche respiratorie gravi, in quelli con una storia di ulcere gastroduodenali o in quelli che stanno assumendo farmaci noti per causare sanguinamento gastrointestinale. Lei deve interrompere il trattamento con carbocisteina in caso di

sanguinamento gastrointestinale. Questo medicinale non deve essere usato in associazione con sedativi della tosse.

Per chi svolge attività sportiva: l'uso di medicinali contenenti alcol etilico, compreso LISOMUCIL TOSSE MUCOLITICO sciroppo con zucchero, può determinare positività ai test antidoping in rapporto ai limiti di concentrazione alcolemica indicati da alcune federazioni sportive.

Altri medicinali e LISOMUCIL TOSSE MUCOLITICO

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Non sono noti disturbi causati dall'associazione con medicinali usati per il trattamento delle malattie delle vie respiratorie superiori e inferiori (interazioni).

Gravidanza e allattamento

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Non deve prendere LISOMUCIL TOSSE MUCOLITICO durante la gravidanza e l'allattamento.

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

LISOMUCIL TOSSE MUCOLITICO non altera la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari.

LISOMUCIL TOSSE MUCOLITICO sciroppo con zucchero contiene saccarosio, metile paraidrossibenzoato, sodio e etanolo (alcool)

Questo medicinale contiene 6 g di saccarosio per 15 ml di sciroppo (1 misurino dosatore o 1 cucchiaino). Da tenere in considerazione in persone affette da diabete mellito. Se il medico le ha diagnosticato una intolleranza ad alcuni zuccheri, lo contatti prima di prendere questo medicinale.

Questo medicinale contiene metile paraidrossibenzoato che può causare reazioni allergiche (anche ritardate). Questo medicinale contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per 15 ml di dose, cioè essenzialmente 'senza sodio'.

Questo medicinale contiene 200 mg di alcool (etanolo) per dose di 15 ml (un misurino dosatore o un cucchiaino) che è equivalente a 4 mg/kg per dose di 15 ml di sciroppo. La quantità di alcool etilico in 15 ml di questo medicinale è equivalente a meno di 5 ml di birra o 2 ml di vino. La piccola quantità di alcol in questo medicinale non produrrà effetti rilevanti.

LISOMUCIL TOSSE MUCOLITICO sciroppo senza zucchero contiene metile paraidrossibenzoato e sodio.

Questo medicinale contiene metile paraidrossibenzoato che può causare reazioni allergiche (anche ritardate). Questo medicinale contiene 90 mg di sodio (componente principale del sale da cucina) per dose da 15 ml (1 cucchiaino) e 270 mg di sodio per la dose di 3 cucchiaini al giorno. Questo equivale rispettivamente a 4,5% e a 13,5% dell'assunzione massima giornaliera raccomandata dall'OMS che corrisponde a 2 g di sodio per un adulto.

3. Come prendere LISOMUCIL TOSSE MUCOLITICO

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

Istruzioni per l'uso: per aprire il flacone preme sul tappo e sviti. Riavviti per chiudere. La confezione include un bicchiere dosatore sul quale sono indicate delle tacche corrispondenti alla quantità in ml. Prenda il prodotto non diluito, indipendentemente dai pasti.

La dose raccomandata per gli adulti è di 15 ml (1 misurino dosatore o 1 cucchiaino), 3 volte al giorno a distanza di 8 ore.

Non superi le dosi indicate senza il consiglio del medico.

La durata massima raccomandata di trattamento è di 5 giorni. Si rivolga al medico se non nota miglioramenti o se nota un peggioramento dei sintomi dopo 5 giorni. Il trattamento per periodi più prolungati può essere effettuato, secondo giudizio del medico.

Se prende più LISOMUCIL TOSSE MUCOLITICO di quanto deve

In caso di sovradosaggio possono verificarsi mal di testa, nausea, diarrea, dolore allo stomaco (gastralgia).

In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di questo medicinale, avverta immediatamente il medico o si rivolga al più vicino ospedale.

Se dimentica di prendere LISOMUCIL TOSSE MUCOLITICO

Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Si rivolga al medico se manifesta uno dei seguenti effetti indesiderati:

Molto comune (possono interessare più di 1 su 10 persone):

- dolore addominale alla parte superiore, nausea, diarrea.

Frequenza non nota (la cui frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili):

- gravi reazioni allergiche (anafilattiche, eruzioni cutanee allergiche, eruzione fissa da farmaci);
- irritazioni e malattie della pelle (sindrome di Steven-Johnson; dermatite bollosa; eritema multiforme; eruzione tossica cutanea eruzione cutanea) (in tali casi interrompere il trattamento e consultare il medico per istituire una terapia idonea);
- fastidio epigastrico;
- vomito;
- sanguinamento gastrointestinale (in tali casi interrompere il trattamento e consultare il medico per istituire una terapia idonea).

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>. Segnalando gli effetti indesiderati può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare LISOMUCIL TOSSE MUCOLITICO

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione dopo "Scad".

La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

LISOMUCIL TOSSE MUCOLITICO sciroppo con zucchero: conservare a temperatura inferiore a 25°C.

LISOMUCIL TOSSE MUCOLITICO sciroppo senza zucchero: questo medicinale non richiede alcuna particolare condizione di conservazione.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene LISOMUCIL TOSSE MUCOLITICO sciroppo con zucchero

- Il principio attivo è carbocisteina: 1 ml di sciroppo contiene 50 mg di carbocisteina.
- Gli altri componenti sono: saccarosio, metile paraidrossibenzoato (E218), polvere di caramello, elisir aromatico (etanolo 82%), essenza di cannella, sodio idrossido, acqua depurata.

Cosa contiene LISOMUCIL TOSSE MUCOLITICO sciroppo senza zucchero

- Il principio attivo è carbocisteina: 1 ml di sciroppo contiene 50 mg di carbocisteina.
- Gli altri componenti sono: glicerolo, idrossietilcellulosa, saccarina sodica, metile paraidrossibenzoato sodico, polvere di caramello, aromatizzante, sodio idrossido, acqua depurata.

Descrizione dell'aspetto di LISOMUCIL TOSSE MUCOLITICO e contenuto della confezione

Confezione contenente 1 flacone da 200 ml e un misurino dosatore.

Il flacone ha una chiusura di sicurezza per rendere difficile l'apertura ai bambini.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

EG S.p.A. Via Pavia, 6 – 20136 Milano

Produttori

Sciroppo senza zucchero

Unither Liquid Manufacturing – Colomiers (Francia)

A. Nattermann & Cie GmbH - Colonia (Germania)

Sciroppo con zucchero

Unither Liquid Manufacturing - Colomiers (Francia)

A. Nattermann & Cie GmbH - Colonia (Germania)

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il 13 Aprile 2022